

健第 280号
平成27年 5月26日

(公社) 岡山県医師会長 殿
(一社) 岡山県病院協会長 殿
(一社) 岡山県薬剤師会長 殿

岡山県保健福祉部健康推進課長

「結核患者に対するDOTS（直接服薬確認療法）の推進について」の
一部改正について

平素から本県の保健福祉行政の推進にご協力いただき感謝申し上げます。

この度、厚生労働省健康局結核感染症課長から別添のとおり通知があったのでご了知いただくとともに、貴会会員への周知についてご配慮方よろしくお願い申し上げます。

なお、今回の国の一部改正を踏まえ、岡山県地域DOTS事業実施要領の見直し等を行う予定としています。

また、結核病床を有する医療機関に対しては、別途通知しております。

本通知につきましては、岡山県保健福祉部からの医療安全情報のお知らせ
(<http://www.pref.okayama.jp/hoken/hohuku/tuuchi/top.htm>) にも掲載しております。

写

健感発0521第1号
平成27年5月21日

各 { 都道府県
保健所設置市
特別区 } 衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

「結核患者に対するDOTS（直接服薬確認療法）
の推進について」の一部改正について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第101号）が本年5月12日に公布され、本年5月21日から施行されることに伴い、「結核患者に対するDOTS（直接服薬確認療法）の推進について」（平成16年12月21日付け健感発第1221001号各都道府県・政令市・特別区衛生主管部（局）長宛て厚生労働省健康局結核感染症課長通知）を別紙のとおり改正し、本年5月21日より取扱うこととした。ついては、貴管下関係機関等に周知いただくとともに、服薬確認を軸とした患者支援のより一層の取組をお願いしたい。

(別紙)

健感発第 1221001 号
平成 16 年 12 月 21 日

各 { 都道府県 }
 { 保健所設置市 } 衛生主管部(局)長 殿
 { 特別区 }

厚生労働省健康局結核感染症課長


結核患者に対する DOTS (直接服薬確認療法) の推進について

結核患者に確実に抗結核薬を服用させることにより結核のまん延を防止するとともに、多剤耐性結核の発生を予防する必要性が高いことにかんがみ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「法」という。)第 53 条の 14 及び第 53 条の 15 に基づく保健所の保健師等による患者の家庭訪問指導及び結核患者等に対する医師による「処方された薬剤を確実に服用する」旨の指示並びに服薬確認を軸とした患者支援の推進については、結核に関する特定感染症予防指針(平成 19 年厚生労働省告示第 72 号。以下「指針」という。)第 3 の 2 を踏まえ、別添「日本版 21 世紀型 DOTS 戦略推進体系図」も参酌の上、引き続き地域の事情に応じた DOTS の積極的な取組を要請する。

なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の 4 第 1 項に規定する技術的な助言とする。

(別 添)

日本版21世紀型DOTS戦略推進体系図



1 DOTS対象者

結核患者については、喀痰塗抹陽性、陰性問わず、再発及び薬剤耐性菌の出現を防止するためには治療完了を徹底する必要がある。また、潜在性結核感染症においても結核発症を予防するためには、治療完了を徹底する必要がある。そのため、医療が必要な全結核患者（潜在性結核感染症を含む。以下「患者」という。）をDOTS対象者とする。

2 院内DOTS

目的：患者の治療の成功を目指して、入院中の病院、地域の医療機関、保健所等が連携して治療終了まで一貫した支援を行い、患者自身が服薬の重要性を理解し、確実に服薬できるように規則的内服を動機づける。

実施主体：患者が入院している病院

参加者：医療機関…医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等
保健所…医師、保健師、結核事務担当等
その他、必要に応じて関係機関も参加する。

方法：①教育指導：結核の知識、服薬の重要性等についての十分な説明
②服薬支援：医療従事者による直接服薬確認及び患者の結核・治療の理解度に関する評価
③保健所等との連携：患者の治療及び服薬に関する情報をDOTSカンファレンス又は個別の連携により関係機関と共有し、必要に応じて諸制度を活用
さらに、社会福祉士等を中心とし、服薬継続の妨げになりうる社会的要因に関して、チームによる包括的な支援を実施するとともに、患者の包括的な分析に基づいて、退院後も見据えた診療方針を策定する。
また、実施の際には、院内DOTSガイドライン（日本結核病学会保健・看護委員会編）等も参考となる。

3 DOTSカンファレンス及び個別患者支援計画の作成

目的：医療機関や保健所等の関係機関が協議し、治療開始から終了に至るまでの患者に対する服薬支援を切れ目なく行う。

実施主体：保健所

参加者：医療機関…医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等
保健所…医師、保健師、結核事務担当等
その他の関係機関…社会福祉士、介護関係者等

方法：入院中の患者に対しては、保健所は主治医と担当看護師を交えた個別のDOTSカンファレンスを持つ。退院前には必要に応じて、社会福祉士等も参加する。保健所は主治医の診療方針に基づいた個別患者支援計画^(注1)を作成し、退院後の確実な服薬支援方法について検討及び協議する。多くの患者を扱っている病院や保健所においては、月1回以上定例的に開催する方法も可能である。

退院後は外来治療中の受療状況や服薬状況を確認し、関係機関が参加して個別患者支援計画の評価・見直しを定期的に行う。

同様に、入院していない患者（通院で治療を開始する患者）に対しても、保健所は個別患者支援計画を作成し服薬状況を確認する。この際、関係機関との地域連携パスや個別の連絡等

でDOTSカンファレンスを代用することも可能である。

(注1) 個別患者支援計画：治療開始から終了に至るまでの一連の患者支援について示したものの。この中で、退院後の具体的な服薬支援方法（いつ、だれが、どのように、服薬確認するのか等）を計画する。患者の治療中断リスク、背景、環境等を考慮して、地域DOTSの実施頻度（※1）と実施方法（※2）を定める。具体的には、「日本版21世紀型DOTS戦略推進体系図」に示した「退院後・通院中の地域DOTSの実施」から「外来DOTS」「訪問DOTS」「連絡確認DOTS」を選択する。

※1 実施頻度の選択：患者のリスク等に応じて、服薬確認頻度を以下のA～Cより選択する。

A：治療中断のリスクが高い患者の服薬確認…原則毎日

対象患者：住所不定者、アルコール依存者、薬物依存者、治療中断歴のある者、再発患者等治療中断のリスクの高い患者

B：服薬支援が必要な患者の服薬確認…週1～2回以上

対象患者：介護を必要とする在宅高齢者や独居高齢者で退院後の治療継続に不安があるため入院を余儀なくされている者等、その他治療中断のリスクが高いが、外来DOTSの実施が困難であると考えられる者を含む。

C：A・B以外の患者の服薬確認…月1～2回以上

対象患者：施設等に入所している高齢者等、服薬確認ができる者がいる生活環境にある者を含む。

※2 実施方法の選択：服薬確認方法は、それぞれの患者の治療中断リスク、背景、環境等を考慮して、外来DOTS、訪問DOTS、連絡確認DOTSのうち最適な服薬確認方法を選択する。状況に応じて、3つの方法を弾力的に組み合わせて実施する。

4 地域DOTS

目的：患者の確実な治療完遂のため、患者の治療中断リスク、背景、環境等を考慮し、患者本人にとって最も適切かつ確実な服薬確認の頻度と方法を採用して実施する。その際、保健所は必要に応じて地域の服薬支援者^(注2)等の関係者とも連携する。

実施主体：保健所

参加者：保健所…医師、保健師、結核事務担当等

医療機関…医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等

その他の関係機関…社会福祉士、介護関係者等

方法：保健所は個別患者支援計画に基づいて服薬支援を行う。入院している患者に対しては、入院中に面接を行い、退院後の服薬支援について説明し理解と承諾を求める。通院で治療を開始する患者に対しても、速やかに訪問・面接を実施し、服薬継続を支援する。

また、特に結核のハイリスクグループ（高齢者、住所不定者、結核の高まん延地域からの入国者等）及びデインジャーグループ（結核を発症すると二次感染を生じやすい職業に就いている者）に対しては重点的に対策を講じるため、法第53条の14に基づき、保健所長は必要に

応じ、患者に十分説明し、理解を得た上で、ハイリスクグループが居住・滞在する施設^(注3)、ハイリスクグループが一定以上の頻度で通う施設^(注4)、ハイリスクグループの居宅等に一定以上の頻度で訪問する者^(注5)、デインジャーグループが就労する場所の事業主^(注6)その他患者の状況や各地域の実情等に応じて保健所長が適当と認めるものにDOTSの実施を依頼することができる。

なお、保健所は毎月、主治医から患者の菌所見などの基本的な病状に関する情報を収集する。

(注2) 服薬支援者：患者の服薬を見届けるあるいは見守る者で、下記の職種等が想定される。

保健所長が服薬支援者に服薬支援を依頼する場合には、患者本人に十分説明し、理解を得る。

なお、患者を診察治療し、処方せんを交付する等の医業は、あくまでも医師が行うものであることから、服薬支援者は患者の服薬を見届けるあるいは見守る者である。

保健所は服薬支援者に対して、結核に関する定期的な研修を行うなど、効果的な服薬支援を行うことができるよう努める。

- ・保健所…保健師、その他の保健所職員、患者への対面服薬確認を行う看護師等、結核や服薬指導に関する訓練を受けた非常勤職員（職種は問わない）
- ・介護保険関係機関…保健師、看護師等
- ・福祉機関…社会福祉士等
- ・市町村…保健師、看護師等
- ・医療機関…看護師等
- ・薬局…薬剤師等
- ・その他、保健所長が適当と認める者…ケアマネジャー、ヘルパー、民生委員、結核予防婦人会員、障害者相談員、母子保健推進委員、社会福祉協議会職員、地域包括支援センター職員等

(注3) ハイリスクグループが居住・滞在する施設：病院・診療所（介護老人保健施設を含む。）、介護保険等の入所系サービスを提供する事業所、矯正施設等

(注4) ハイリスクグループが一定以上の頻度で通う施設：学校、介護保険等の通所サービスを提供する事業所等

(注5) ハイリスクグループの居宅等に一定以上の頻度で訪問する者：訪問看護、訪問介護等を提供する者等

(注6) デインジャーグループが就労する場所の事業主：病院・診療所、学校、薬局等

1) 外来DOTS

- ・服薬確認場所：入院した病院や地域の診療所の外来、薬局、介護老人保健施設又は保健所
- ・服薬確認方法：患者は、看護師、保健師、薬剤師、医師等の目の前で服薬をする。土日・祝日についても、飲み終わった薬の包装（PTPシート）を翌日に持参してもらう等、弾力的に確認を行う。

- ・記録：服薬を確認した看護師、保健師、薬剤師、医師等は、診療録・結核登録票等に記録する。
また、本人の服薬手帳にサインをする。
- ・薬剤の保管：服薬確認頻度の高い患者の薬剤は病院や診療所の外来又は保健所で管理する。服薬確認頻度の低い患者は自身で薬剤を管理し、外来DOTS時に持参する。
- ・来所しないときの対応：看護師など施設等の職員は、その日のうちに保健所担当者に連絡をする。
保健所は早急に家庭訪問を行うなど対応する。

2) 訪問DOTS

- ・服薬確認場所：家庭等
- ・服薬確認方法：保健所保健師の他、関係機関の服薬支援者が、その患者のリスクに応じて必要回数訪問し、直接、服薬を見届ける。なお、保健所長は服薬支援者が行う服薬確認について監督指導するとともにその責任を負うものとする。土日・祝日や訪問しない日についても、飲み終わった薬の包装（PTPシート）などで、弾力的に確認を行う。
- ・記録：服薬を確認した保健師、看護師、薬剤師及びその他の服薬支援者は、診療録・結核登録票等に記録する。また、本人の服薬手帳にサインをする。
- ・薬剤の保管：薬剤は家庭で保管するが、薬の飲み忘れを防ぐ保管の方法を工夫する。
- ・服薬に問題がある場合の対応：服薬支援者は、その日のうちに保健所担当者に連絡をする。保健所は早急に家庭訪問を行うなど対応する。
- ・受療に問題がある場合の対応：保健所は直ちに主治医や関係機関と協議して適切な対応をとる。

3) 連絡確認DOTS

- ・服薬確認場所：特に所定の場所はない。
- ・服薬確認方法：保健所は、患者本人にとって最も適切かつ確実な方法で服薬状況を確認する。
また、患者への支援強化のため、保健所長は、法第53条の14に基づき、患者の状況や地域の実情に応じて、服薬支援者に連絡確認DOTSの実施を依頼することができる。
なお、保健所長は服薬支援者が行う服薬確認について監督指導するとともに、その責任を負うものとする。
例えば、福祉施設や矯正施設等に入所している患者については施設職員等が、学校に通学している患者については養護教諭等が毎日、直接服薬を見守り、保健所はその状況(記録)を確認する。確認にあたっては、患者の確実な治癒が目的であるため、可能な限り患者と面接を行うなど信頼関係を築くことに努める。
- ・記録：患者及び施設職員等の服薬支援者は服薬手帳に毎日の服薬状況を記録する。
- ・薬剤の保管：薬剤は家庭又は施設で保管するが、薬の飲み忘れを防ぐ保管の方法を工夫する。
- ・受療に問題がある場合の対応：服薬支援者は治療中断等の問題が生じたときは、無理に服薬をするよう指導することは避け、その日のうちに保健所担当者に連絡をする。保健所は直ちに主治医と協議して適切な対応をとる。

5 コホート検討会

目的：DOTS対象者全員の治療成績のコホート分析とその検討を行う。具体的には、地域DOTSの実施方法及び患者支援の評価・見直しを行い、地域DOTS体制の強化を図る。合わせて地域の結核医療及び結核対策全般に関する課題について検討を行う。必要に応じて患者の服薬支援に関わる全ての職員の参加を得る。

実施主体：保健所

参加者：保健所…医師、保健師、結核事務担当、結核の診査に関する協議会委員等
医療機関…医師、看護師、薬剤師等
その他の関係機関…社会福祉士、介護関係者、服薬支援者等

実施頻度：年2回以上

結核の診査に関する協議会に併せて実施することも可能

評価指標：

- ・全結核患者に対するDOTS実施率。
(指針における目標：DOTS実施率：95%以上)

<DOTS 実施率算定式>

$$\text{DOTS 実施率} = \frac{\text{DOTS を実施した患者}}{\text{対象年の新登録患者 (転入者を含む)}} \\ \text{治療開始前又は治療開始後 1 か月未満に死亡した者及び} \\ \text{転出者を除く (潜在性結核感染症は別途集計)}$$

- ・治療が終了した者（1年前に登録された患者）に対する治療成績。
(指針における目標：治療失敗・脱落率：5%以下)
- ・治療中の登録されている患者に対する治療状況の把握。
(目標例：菌所見（培養・同定・感受性）の把握率：100%）

評価のためのチェックポイント

- ・毎月の菌所見、使用薬剤、治療状況、副作用の有無等の把握
- ・菌（培養）陰性化の確認
- ・DOTS実施状況（個別患者支援計画に沿った支援の評価）
- ・治療失敗、中断例に関する症例検討の実施
- ・接触者健診の状況


結果の還元：コホート観察による治療成績や実際に行われた患者支援に関する情報を医療機関に還元する。

新旧対照表

(参考)

結核患者に対するDOTS（直接服薬確認療法）の推進について

(平成16年12月21日付け健感発第1221001号各都道府県・政令市・特別区衛生主管部（局）長宛て厚生労働省健康局結核感染症課長通知)



<p>1 DOTS対象者 結核患者については、喀痰塗抹陽性、陰性問わず、再発及び薬剤耐性菌の出現を防止するためには治療完了を徹底する必要がある。また、潜在性結核感染症においても結核発症を予防するためには、治療完了を徹底する必要がある。そのため、医療が必要な全結核患者（<u>潜在性結核感染症を含む。以下「患者」という。</u>）をDOTS対象者とする。</p> <p>2 院内DOTS 目的：患者の治療の成功を目指して、入院中の病院、地域の医療機関、保健所等が連携して治療終了まで一貫した支援を行い、患者自身が服薬の重要性を理解し、確実に服薬できるように規則的内服を動機づける。 実施主体：<u>患者が入院している病院</u> 参加者：<u>医療機関…医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等</u> <u>保健所…医師、保健師、結核事務担当等</u> <u>その他、必要に応じて関係機関も参加する。</u> 方法：①教育指導：結核の知識、服薬の重要性等についての十分な説明 ②服薬支援：医療従事者による直接服薬確認及び患者の結核・治療の理解度に関する評価 ③保健所等との連携：患者の治療及び服薬に関する情報をDOTSカンファレンス又は個別の連携により関係機関と共有し、必要に応じて諸制度を活用 さらに、<u>社会福祉士</u>等を中心とし、服薬継続の妨げになり得る社会的要因に関して、チームによる包括的な支援を実施するとともに、<u>患者の包括的な分析に基づいて、退院後も見据えた診療方針を策定する。</u> <u>また、実施の際には、院内DOTSガイドライン（日本結核病学会保健・看護委員会編）等も参考となる。</u></p>	<p>1 DOTS対象者 結核患者については、<u>喀痰塗抹陽性患者、喀痰塗抹陰性患者</u>問わず、再発及び薬剤耐性菌の出現を防止するためには治療完了を徹底する必要がある。また、<u>潜在性結核感染症患者</u>においても結核発症を予防するためには、治療完了を徹底する必要がある。そのため、医療が必要な全結核患者をDOTS対象者とする。</p> <p>2 院内DOTS 目的：<u>結核患者</u>の治療の成功を目指して、入院中の病院、地域の医療機関、保健所等が連携して治療終了まで一貫した支援を行い、患者自身が服薬の重要性を理解し、確実に服薬できるように規則的内服を動機づける<u>こと。</u> 実施主体：<u>結核患者を入院させている病院</u> (新設) 方法：①教育指導：結核の知識、服薬の重要性等についての十分な説明 ②服薬支援：医療従事者による直接服薬確認及び<u>結核患者</u>の結核・治療の理解度に関する評価 ③保健所等との連携：患者の治療及び服薬に関する情報をDOTSカンファレンス又は個別の連携により関係機関と共有し、必要に応じて諸制度を活用 さらに、<u>ソーシャルワーカー</u>等を中心とし、服薬継続の妨げになり得る社会的要因に関して、チームによる包括的な支援を実施。 <u>また、患者の包括的な分析に基づいて、退院後も見据えた診療方針を策定する。</u> <u>なお、具体的な方法については、院内DOTSガイドライン（日本結核病学会保健・看護委員会編）を参照されたい。</u></p>
---	---

<p>3 <u>DOTSカンファレンス及び個別患者支援計画の作成</u></p> <p>目的：医療機関や保健所等の関係機関が協議し、治療開始から終了に至るまでの患者に対する服薬支援を<u>切れ目なく行う</u>。</p> <p>実施主体：保健所 参加者：医療機関…医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等</p> <p>保健所…医師、保健師、結核事務担当等 その他の関係機関…社会福祉士、介護関係者等</p> <p>方法：入院中の患者に対しては、保健所は主治医と担当看護師を交えた個別のDOTSカンファレンスを持つ。退院前には必要に応じて、<u>社会福祉士</u>等も参加する。保健所は主治医の診療方針に基づいた個別患者支援計画^(注1)を作成し、退院後の<u>確実な服薬支援方法</u>について検討及び協議する。多くの患者を扱っている病院や保健所においては、月1回以上定例的に開催する方法も<u>可能である</u>。</p> <p>退院後は外来治療中の受療状況や服薬状況を確認し、<u>関係機関</u>が参加して個別患者支援計画の評価・見直しを定期的に行う。</p> <p>同様に、入院していない患者（<u>通院で治療を開始する患者</u>）に対しても、保健所は個別患者支援計画を作成し服薬状況を確認する。この際、<u>関係機関との地域連携パスや個別の連絡等でDOTSカンファレンスを代用することも可能である</u>。</p> <p>(注1) 個別患者支援計画：治療開始から終了に至るまでの一連の患者支援について示したもの。この中で、退院後の具体的な服薬支援方法（いつ、だれが、どのように、服薬確認するのか等）を計画する。<u>患者の治療中断リスク、背景、環境等を考慮して、地域DOTSの実施頻度（※1）と実施方法（※2）を定める。具体的には、「日本版21世紀型DOTS戦略推進体系図」に</u></p>	<p>3 <u>DOTSカンファレンス</u></p> <p>目的：医療機関や保健所等の関係機関が協議し、治療開始から終了に至るまでの患者に対する服薬支援の<u>徹底を図ること</u>。</p> <p>実施主体：保健所 参加者：医療機関…医師、看護師、<u>外来看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師、臨床検査技師等</u></p> <p>保健所…医師、保健師、結核事務担当等 その他の関係機関…社会福祉士、介護関係者等</p> <p>方法：入院中の患者に対しては、保健所は主治医と担当看護師を交えた個別のDOTSカンファレンスを持つ。退院前には必要に応じて、<u>ソーシャルワーカー</u>等も参加する。保健所は主治医の診療方針に基づいた個別患者支援計画^(注1)を作成し、退院後の<u>確実な服薬支援方法</u>について検討及び協議する。多くの患者を扱っている病院や保健所においては、月1回以上定例的に開催する方法も<u>よい</u>。</p> <p>退院後は外来治療中の受療状況や服薬状況を確認し、<u>関わる職種</u>が参加して個別患者支援計画の評価・見直しを定期的に行い、<u>服薬終了を確認する</u>。</p> <p>同様に、<u>入院が不要な患者（外来で治療を開始する患者（潜在性結核感染症患者を含む。））</u>に対しても、保健所は個別患者支援計画を作成し服薬終了まで支援する。この際、<u>DOTSカンファレンスを関係機関との地域連携パスや個別の連絡等で代用してもよい</u>。</p> <p>(注1) 個別患者支援計画：治療開始から終了に至るまでの一連の患者支援について示したもの。この中で、退院後の具体的な服薬支援方法（いつ、だれが、どのように、服薬確認するのか等）を計画する。<u>治療中断のリスク・患者の利便性・地域の実情を考慮して、図に示した「退院後・通院中の地域DOTSの実施」から「外来DOTS」「訪問DOTS」「連絡</u></p>
---	---

示した「退院後・通院中の地域DOTSの実施」から「外来DOTS」「訪問DOTS」「連絡確認DOTS」を選択する。

※1 実施頻度の選択：患者のリスク等に応じて、服薬確認頻度を以下のA～Cより選択する。

A：治療中断のリスクが高い患者の服薬確認…原則毎日
対象患者：住所不定者、アルコール依存者、薬物依存者、治療中断歴のある者、再発患者等治療中断のリスクの高い患者

B：服薬支援が必要な患者の服薬確認…週1～2回以上
対象患者：介護を必要とする在宅高齢者や独居高齢者で退院後の治療継続に不安があるため入院を余儀なくされている者等、その他治療中断のリスクが高いが、外来DOTSの実施が困難であると考えられる者を含む。

C：A・B以外の患者の服薬確認…月1～2回以上
対象患者：施設等に入所している高齢者等、服薬確認ができる者がいる生活環境にある者を含む。

※2 実施方法の選択：服薬確認方法は、それぞれの患者の治療中断リスク、背景、環境等を考慮して、外来DOTS、訪問DOTS、連絡確認DOTSのうち最適な服薬確認方法を選択する。状況に応じて、3つの方法を弾力的に組み合わせて実施する。

確認DOTS」を選択する。

実施頻度の選択：患者の状況の変化に応じて、服薬確認頻度を以下のA～Cより選択する。

A：治療中断のリスクが高い患者の服薬確認…原則毎日
対象患者：住所不定者、アルコール依存症患者、薬物依存者、治療中断歴のある者、再発患者等治療中断のリスクの高い患者

B：服薬支援が必要な患者の服薬確認…週1～2回以上
対象患者：介護を必要とする在宅高齢者や独居高齢者で退院後の治療継続に不安があるため入院を余儀なくされている者等、服薬中断のリスクが高いが、外来DOTSの実施が困難であると考えられる者を含む。

C：A・B以外の全ての患者の服薬確認…月1～2回以上
対象患者：施設等に入所している高齢者等、服薬確認ができる者がいる生活環境にある者を含む。

実施方法の選択：服薬確認方法は、それぞれの患者の背景と地域の実情に合わせて、外来DOTS、訪問DOTS、連絡確認DOTSのうち最適な服薬確認方法を実施。状況に応じて、3つの方法を弾力的に組み合わせて実施する。

4 地域DOTS

目的：患者の確実な治療完遂のため、患者の治療中断リスク、背景、環境等を考慮し、患者本人にとって最も適切かつ確実な服薬確認の頻度と方法を採用して実施する。その際、保健所は必要に応じて地域の服薬支援者^(注2)等の関係者とも連携する。

4 地域DOTS

目的：患者の背景及び地域の実情に応じて、患者本人にとって最も適切かつ確実な服薬支援の頻度と方法を採用し、関係者の連携の下で治療完遂を目指す。

<p>実施主体：保健所 参加者：保健所…医師、保健師、結核事務担当等 医療機関…医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等 その他の関係機関…社会福祉士、介護関係者等</p> <p>方法：保健所は個別患者支援計画に基づいて服薬支援を行う。入院している患者に対しては、入院中に面接を行い、退院後の服薬支援について説明し理解と承諾を求める。通院で治療を開始する患者に対しても、速やかに訪問・面接を実施し、服薬継続を支援する。 また、特に結核のハイリスクグループ（高齢者、住所不定者、結核の高まん延地域からの入国者等）及びデインジャーグループ（結核を発症すると二次感染を生じやすい職業に就いている者）に対しては重点的に対策を講じるため、法第53条の14に基づき、保健所長は必要に応じ、患者に十分説明し、理解を得た上で、ハイリスクグループが居住・滞在する施設^(注3)、ハイリスクグループが一定以上の頻度で通う施設^(注4)、ハイリスクグループの居宅等に一定以上の頻度で訪問する者^(注5)、デインジャーグループが就労する場所の事業主^(注6)その他患者の状況や各地域の実情等に応じて保健所長が適当と認めるものにDOTSの実施を依頼することができる。</p> <p>なお、保健所は毎月、主治医から患者の菌所見などの基本的な病状に関する情報を収集する。</p>	<p>(新設)</p> <p>方法：保健所は患者の服薬中断リスク、背景等によって地域DOTSの実施頻度と実施方法を定めた個別患者支援計画に基づき、地域において服薬支援を実施する。入院中の患者に面接を行い、退院後の服薬支援について説明し理解と承諾を求める。入院が不要な患者（外来で治療を開始する患者（潜在性結核感染症患者を含む。））に対しても、速やかに訪問・面接を実施し、患者や家族の不安軽減を図りながら、規則的な服薬の動機づけを行い服薬継続を支援する。</p>
<p>(注2) 服薬支援者：患者の服薬を見届けるあるいは見守る者で、下記の職種等が想定される。 保健所長が服薬支援者に服薬支援を依頼する場合には、患者本人に十分説明し、理解を得る。 なお、患者を診察治療し、処方せんを交付する等の医業は、あくまでも医師が行うものであることから、服薬支援者は患者の服薬を見届けるあるいは見守る者である。 保健所は服薬支援者に対して、結核に関する定期的な研修を行うなど、効果的な服薬支援を行うことができるよう努める。</p>	<p>(注2) 服薬支援者：患者に対して直接、服薬を見届ける者で、下記の職種等とする。 保健所は採用時、採用後の定期的な研修を行い、服薬支援者の質の向上を図る。</p>

<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>保健所…保健師、その他の保健所職員、患者への対面服薬確認を行う看護師等、結核や服薬指導に関する訓練を受けた非常勤職員（職種は問わない）</u> ・ <u>介護保険関係機関…保健師、看護師等</u> ・ <u>福祉機関…社会福祉士等</u> ・ <u>市町村…保健師、看護師等</u> ・ <u>医療機関…看護師等</u> ・ <u>薬局…薬剤師等</u> ・ <u>その他、保健所長が適当と認める者…ケアマネジャー、ヘルパー、民生委員、結核予防婦人会員、障害者相談員、母子保健推進委員、社会福祉協議会職員、地域包括支援センター職員等</u> <p>(注3) <u>ハイリスクグループが居住・滞在する施設：病院・診療所（介護老人保健施設を含む。）、介護保険等の入所系サービスを提供する事業所、矯正施設等</u></p> <p>(注4) <u>ハイリスクグループが一定以上の頻度で通う施設：学校、介護保険等の通所サービスを提供する事業所等</u></p> <p>(注5) <u>ハイリスクグループの居宅等に一定以上の頻度で訪問する者：訪問看護、訪問介護等を提供する者等</u></p> <p>(注6) <u>デインジャーグループが就労する場所の事業主：病院・診療所、学校、薬局等</u></p>	
<p>1) 外来DOTS</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>服薬確認場所：入院した病院や地域の診療所の外来、薬局、介護老人保健施設又は保健所</u> ・ <u>服薬確認方法：患者は、看護師、保健師、薬剤師、医師等の目の前で服薬をする。土日・祝日についても、飲み終わった薬の包装（PTPシート）を翌日に持参してもらう等、弾力的に確認を行う。</u> ・ <u>記録：服薬を確認した看護師、保健師、薬剤師、医師等は、診療録・結核登録票等に記録する。また、本人の服薬手帳にサインをする。</u> 	<p>1) 外来DOTS</p> <ul style="list-style-type: none"> ① <u>服薬確認場所：入院した病院や地域の診療所の外来、調剤薬局又は保健所</u> ② <u>服薬確認方法：患者は、看護師、保健師、薬剤師、医師等の目の前で服薬をする。</u> ③ <u>記録：服薬を確認した看護師、保健師、薬剤師、医師等は、診療録・結核登録票等に記録する。また、本人の服薬手帳にサインをする。</u>

<p>・<u>薬剤の保管</u>：服薬確認頻度の高い患者の薬剤は病院や診療所の外来又は保健所で管理する。服薬確認頻度の低い患者は自身で薬剤を管理し、外来DOTS時に持参する。 (・服薬確認方法の後に移動)</p> <p>(削除)</p> <p>・<u>来所しないときの対応</u>：看護師など施設等の職員は、その日のうちに保健所担当者に連絡をする。保健所は<u>早急に家庭訪問を行う</u>など対応する。</p> <p>2) 訪問DOTS</p> <p>・<u>服薬確認場所</u>：家庭等</p> <p>・<u>服薬確認方法</u>：保健所保健師の他、関係機関の服薬支援者が、その患者のリスクに応じて必要回数訪問し、直接、服薬を見届ける。<u>なお、保健所長は服薬支援者が行う服薬確認について監督指導するとともにその責任を負うものとする。土日・祝日や訪問しない日についても、飲み終わった薬の包装（PTPシート）などで、弾力的に確認を行う。</u></p> <p>・<u>記録</u>：服薬を確認した保健師、看護師、薬剤師及びその他の服薬支援者は、診療録・結核登録票等に記録する。また、本人の服薬手帳にサインをする。 (・服薬確認方法の後に移動)</p> <p>・<u>薬剤の保管</u>：薬剤は家庭で保管するが、薬の飲み忘れを防ぐ保管の方法を工夫する。 (削除)</p> <p>・<u>服薬に問題がある場合の対応</u>：服薬支援者は、その日のうちに保健所担当者に連絡をする。保健所は<u>早急に家庭訪問を行う</u>など対応する。</p>	<p>④<u>薬剤の保管</u>：服薬確認頻度の高い患者の薬剤は病院や診療所の外来又は保健所で管理する。服薬確認頻度の低い患者は自身で薬剤を管理し、外来DOTS時に持参する。</p> <p>⑤<u>土日・祝日の対応</u>：服薬確認頻度が高い患者については、<u>飲み終わった薬の包装（PTPシート）を翌日に持参してもらう等、弾力的に確認を行う。</u></p> <p>⑥<u>菌所見の把握</u>：保健所は、毎月、主治医から患者の菌所見などの基本的な病状に関する情報を収集する。</p> <p>⑦<u>来所しないときの対応</u>：病院や診療所の看護師は、その日のうちに保健所担当者に連絡し、保健所は家庭訪問をするなど対応策を図る。</p> <p>2) 訪問DOTS</p> <p>①<u>服薬確認場所</u>：家庭等</p> <p>②<u>服薬確認方法</u>：保健所保健師の他、関係機関の服薬支援者^(注2)が、その患者のリスクに応じて必要回数訪問し、直接、服薬を見届ける。保健所は服薬支援者が行う服薬確認について監督指導する<u>責任を持つ。</u></p> <p>③<u>記録</u>：服薬を確認した保健師・看護師・薬剤師等は、診療録・結核登録票等に記録する。また、本人の服薬手帳にサインをする。</p> <p>④<u>土日・祝日や訪問しない日の対応</u>：<u>飲み終わった薬の包装（PTPシート）などで、弾力的に確認を行う。</u></p> <p>⑤<u>薬剤の保管</u>：薬剤は家庭で保管するが、薬の飲み忘れを防ぐ保管の方法を工夫する。</p> <p>⑥<u>菌所見の把握</u>：保健所は、毎月、主治医から患者の菌所見などの基本的な病状に関する情報を収集する。</p> <p>⑦<u>服薬に問題がある場合の対応</u>：服薬支援者は服薬中断等の問題が生じたときは、その日のうちに保健所担当者に連絡をする。保健所は家庭訪問をする</p>
---	--

<p>・<u>受療に問題がある場合の対応</u>：保健所は直ちに主治医や関係機関と協議して適切な対応をとる。</p> <p>(4 地域DOTSの後に移動)</p> <p>3) 連絡確認DOTS (削除)</p> <p>・<u>服薬確認場所</u>：特に所定の場所はない。</p> <p>・<u>服薬確認方法</u>：保健所は、患者本人にとって最も適切かつ確実な方法で服薬状況を確認する。</p> <p>また、患者への支援強化のため、保健所長は、<u>法第53条の14に基づき、患者の状況や地域の実情に応じて、服薬支援者に連絡確認DOTSの実施を依頼することができる。</u></p> <p><u>なお、保健所長は服薬支援者が行う服薬確認について監督指導するとともに、その責任を負うものものとする。</u></p> <p><u>例えば、福祉施設や矯正施設等に入所している患者については施設職員等が、学校に通学している患者については養護教諭等が毎日、直接服薬を見守り、保健所はその状況(記録)を確認する。確認にあたっては、患者の確実な治</u></p>	<p>など早急に対応策を図る。</p> <p>⑧<u>受療に問題がある場合の対応</u>：保健所は直ちに主治医や関係機関と協議して適切な対応策を図る。</p> <p>(注2) 服薬支援者：患者に対して直接、服薬を見届ける者で、下記の職種等とする。</p> <p>保健所は採用時、採用後の定期的な研修を行い、服薬支援者の質の向上を図る。</p> <p>・保健所…保健師、その他の保健所職員、結核患者への対面服薬確認を行う看護師等、結核や服薬指導に関する訓練を受けた非常勤職員(職種は問わない)</p> <p>・介護保険関係機関…保健師等、看護師、ケアマネージャ、ヘルパー等</p> <p>・福祉機関…社会福祉士等</p> <p>・市町村…保健師又は看護師等</p> <p>・医療機関…外来看護師等</p> <p>・調剤薬局…薬剤師等</p> <p>3) 連絡確認DOTS</p> <p>①<u>対象患者</u>：外来DOTS、訪問DOTS以外の全ての患者。</p> <p>②<u>服薬確認場所</u>：特に所定の場所はない。</p> <p>③<u>服薬確認方法</u>：保健所は、患者本人にとって最も適切かつ確実な方法で服薬状況を確認する。</p> <p>福祉施設等に入所している患者については、<u>施設職員が毎日直接服薬を見届け、保健所保健師はその状況(記録)を確認する。ただし、確認のみが目的とならないよう十分留意すること。目的は患者の確実な治癒であるため、患者と可能な限り面接を行うなど信頼関係を築くことを優先する。</u></p>
--	---

<p>癒が目的であるため、患者と可能な限り面接を行うなど信頼関係を築くことに努める。</p> <p>・記録：患者及び施設職員等の服薬支援者は服薬手帳に毎日の服薬状況を記録する。</p> <p>・薬剤の保管：薬剤は家庭又は施設で保管するが、薬の飲み忘れを防ぐ保管の方法を工夫する。</p> <p>(削除)</p> <p>・受療に問題がある場合の対応：<u>服薬支援者は治療中断等の問題が生じたときは、無理に服薬するよう指導することは避け、その日のうちに保健所担当者に連絡をする。保健所は直ちに主治医と協議して適切な対応をとる。</u></p> <p>5 コホート検討会</p> <p>目的：DOTS対象者全員の治療成績のコホート分析とその検討を行う。<u>具体的には、地域DOTSの実施方法及び患者支援の評価・見直しを行い、地域DOTS体制の強化を図る。合わせて、地域の結核医療及び結核対策全般に関する課題について検討を行う。</u>必要に応じて患者の服薬支援に関わる全ての職員の参加を得る。</p> <p>実施主体：保健所</p> <p>参加者：保健所…医師、保健師、結核事務担当、結核の診査に関する協議会委員等 医療機関…医師、看護師、薬剤師等 <u>その他の関係機関…社会福祉士、介護関係者、服薬支援者等</u></p> <p>実施頻度：年2回以上 結核の診査に関する協議会に併せて実施することも可能</p> <p>評価指標： <u>・全結核患者に対するDOTS実施率。</u> <u>(指針における目標：DOTS実施率：95%以上)</u></p>	<p>④記録：患者及び施設職員は服薬手帳に毎日の服薬状況を記録する。</p> <p>⑤薬剤の保管：薬剤は家庭又は施設で保管するが、薬の飲み忘れを防ぐ保管の方法を工夫する。</p> <p>⑥菌所見の把握：保健所は、毎月、主治医から患者の菌所見、受療状況、投薬日数などの基本的な病状に関する情報を収集する。</p> <p>⑦受療に問題がある場合の対応：保健所は直ちに主治医と協議して適切な対応をとる。</p> <p>5 コホート検討会</p> <p>目的：DOTS対象者全員の治療成績のコホート分析とその検討を行う。<u>その中で治療不成功の原因を検討し、地域DOTS実施方法及び患者支援の評価・見直しを行い、地域DOTS体制の推進を図る。あわせて、地域の結核医療及び結核対策全般に関する課題について検討を行う。</u>必要に応じて患者の服薬支援に関わる全ての職員の参加を得る。</p> <p>実施主体：保健所</p> <p>参加者：保健所…医師、保健師、結核事務担当等関係職員、結核の診査に関する協議会委員等 医療機関…医師、看護師、薬剤師、<u>社会福祉士、介護関係者等</u></p> <p>実施頻度：年2回以上 結核の診査に関する協議会に併せての実施も可能</p> <p>評価指標： (新設)</p>
---	--

<DOTS実施率算定式>

DOTS実施率 =

DOTSを実施した患者

対象年の新登録患者（転入者を含む）

治療開始前又は治療開始後1か月未満に死亡した者及び
転出者を除く（潜在性結核感染症は別途集計）

・ 治療が終了した者（1年前に登録された患者）に対する治療成績。

（指針における目標：治療失敗・脱落率：5%以下）

・ 治療中の登録されている患者に対する治療状況の把握。

（目標例：菌所見（培養・同定・感受性）の把握率：100%）

評価のためのチェックポイント

- ・ 毎月の菌所見、使用薬剤、治療状況、副作用の有無等の把握
- ・ 菌（培養）陰性化の確認
- ・ DOTS実施状況（個別患者支援計画に沿った支援の評価）
- ・ 治療失敗、中断例に関する症例検討の実施
- ・ 接触者健診の状況

結果の還元：コホート観察による治療成績や実際に行われた患者支援に関する情報を医療機関に還元する。

① 治療終了者（1年前に登録された患者）に対して、治療成績を評価する。

（目標例：全結核患者に対するDOTS実施率：95%以上、治療失敗・脱落率：5%以下）

② 治療中の登録患者に対して、治療状況を把握する。

（目標例：菌所見（培養・同定・感受性）の把握率：100%）

評価のためのチェックポイント

- ・ 毎月の菌所見及び使用薬剤や治療状況、副作用の有無等の把握
- ・ 菌（培養）陰性化の確認
- ・ DOTS実施状況（個別患者支援計画に沿った支援の評価）
- ・ 治療失敗、中断例については症例検討の実施
- ・ 接触者健診の状況

結果の還元：コホート観察による治療成績や実際に行われた患者支援に関する情報を医療機関に還元する。